


院外薬局からの  
疑義照会内容

薬薬連携研修会

2021年3月25日


# 疑義照会状況

調査期間：2020年1月～12月



# 疑義照会状況


調査期間：2020年1月～12月



定期内服の処方継続のもの（処方漏れ）  
患者より希望あった内服薬、外用剤

# 疑義照会状況

調査期間：2020年1月～12月



# 処方変更のあった疑義

- ① 検査値 クレアチニン
- ② 重複・相互作用に起因するもの

# ① クレアチニンからの処方変更 22件

薬剤	排泄	推定Ccr	問い合わせ内容	対応
ｸﾘｰｼﾞ ㇿ <sup>ㇿ</sup>	腎排泄	推定Ccr52.3mL/min	開始用量 ｸﾘｰｼﾞ ㇿ(5) 2T 2× でOK?	添付文書通りの用法用量へ変更
		推定Ccr約40程度	〃	〃
		推定Ccr41mL/min	〃	〃
		推定Ccr33.2mL/min	〃	〃
		推定Ccr31.1mL/min	〃	〃
		推定Ccr46.9mL/min	ｸﾘｰｼﾞ ㇿ(5) 4T 2× でOK?	〃
ﾌﾞﾙｰｼﾞ ㇿ	腎排泄	推定Ccr24.6mL/min	ﾌﾞﾙｰｼﾞ ㇿ(20) 1T 1× でOK?	添付文書通りの用法用量へ変更
		推定Ccr18.5mL/min	〃	〃
		推定Ccr28.9mL/min	〃	〃
		推定Ccr29.7mL/min	〃	〃
		推定Ccr22mL/min	〃	〃
		推定Ccr24.6mL/min	〃	〃
ㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿ	腎排泄	推定Ccr34.8mL/min	ㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿ 3T 3× でOK?	ｶｰﾄﾞㇿㇿへ変更
		推定Ccr38.8mL/min	ㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿ 疼痛時 1T でOK?	ｶｰﾄﾞㇿㇿへ変更
		推定Ccr23.2mL/min	ㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿ 3T 3× でOK?	ㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿ 2T 2× へ減量
ㇿㇿ ㇿㇿㇿㇿㇿ	腎排泄	推定Ccr36.2mL/min	ㇿㇿ ㇿㇿㇿㇿㇿ(500) 1T 1× でOK?	添付文書通りの用法用量へ変更
		推定Ccr39.3mL/min	〃	〃
ㇿㇿㇿㇿㇿ ㇿ <sup>ㇿ</sup>	腎排泄	推定Ccr25.4mL/min	ㇿㇿㇿㇿㇿ ㇿ(50) 1T 1× でOK?	ﾄﾗㇿㇿㇿㇿㇿへ変更
ㇿㇿㇿㇿㇿ	腎排泄	推定Ccr30台	ㇿㇿㇿㇿㇿ 3T 3× でOK?	ㇿㇿㇿㇿㇿ 2T 2× へ変更
ㇿㇿㇿ <sup>ㇿ</sup>	腎排泄	推定Ccr41mL/min K 4.59 mEq/l	ㇿㇿㇿ50mg 1T/日	ㇿㇿㇿㇿㇿ25mg 1T/日へ減量 高Kを誘発する恐れがあるためCcr30 以下は禁忌。 中等度の腎機能障害患者は最大用量25mg/日
ㇿㇿㇿㇿㇿ <sup>ㇿ</sup>	腎排泄	推定Ccr35.9mL/min	ㇿㇿㇿㇿㇿ(60) 1T/日	ㇿㇿㇿㇿㇿ(60) 0.5T/日へ減量
ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ <sup>ㇿ</sup>	腎排泄	推定Ccr32.5mL/min	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ散 10mg/g 8g/日	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ散 <sup>ㇿ</sup> 10mg/g 6g/日へ減量

## ② 重複・相互作用に起因する変更

総件数 61件

当院処方内での重複  
32件

当院処方と他院処方  
との重複  
29件

# 当院処方での重複内容

内容	件数
同一処方の重複	13
同一薬効、類似薬効の重複 PPIとH2ブロッカー、PPIとPCABなど Ca拮抗剤 GLP-1受容体作動薬とインスリン・GLP-1受容体作動薬の合剤 抗アレルギー薬 スタチン系薬 軟膏の種類	16
禁忌薬 シクロスポリン®とパルモディア® ベルソムラ®とクラリスロマイシン COPD治療配合剤と前立腺肥大症	3



# 当院処方と他院処方での重複内容

内容	件数
同一薬効の重複 PPIとH2ブロッカー、PPIとPCABなど 抗凝固薬 Ca拮抗剤 $\beta$ ブロッカー NSAIDs 泌尿器系薬 抗アレルギー薬 ビタミン剤、去痰剤、下剤 抗生剤、抗ウイルス剤 など	28
禁忌薬 COPD治療配合剤と前立腺肥大症	1